

Gastric outlet syndrom

Gastric outlet obstruction se také označuje jako gastric outlet syndrom. Jde o mechanickou obstrukci distální části žaludku v oblasti pylorického kanálu. Můžeme ho zařadit mezi [poruchy vyprazdňování žaludku](#).

Příčiny

Existují benigní (nezhoubné) i maligní (zhoubné) příčiny. Z nezhoubných se nejčastěji jedná o důsledek [vředové choroby](#) gastroduodena (edém, pozánětlivé striktury), dále byl gastric outlet syndrom pozorován u **pseudocyst hlavy slinivky**, u žaludeční **tuberkulózy**, u **amyloidózy** a v rámci striktur po chirurgických zákrocích. V novorozeneckém věku sem spadají případy [hypertrofické pylorostenózy](#). Z maligních příčin způsobují obtíže zejména zhoubné [nádory žaludku](#).

Projevy

Obstrukce pylorického kanálu vede k narušení vyprazdňování žaludku a to vyvolává bolesti břicha v nadbříšku a postprandiální (po jídle) zvracení nenatrávené potravy. S jídlem rychle přichází pocit plnosti, nadmutí a říhání.

Diagnostika

Kromě anamnézy a fyzikálního vyšetření má největší význam [ezofagogastroskopie](#), **kontrastní pasáž žaludkem** a zobrazovací metody (UZ a **CT břicha**).

Terapie

Terapie závisí na vyvolávající příčině. U vředové choroby se podávají blokátory protonové pumpy s dočasnou parenterální hydratací a nutricí a případně zavedení nasogastrické sondy k odvádění žaludečních šťáv. Z endoskopických zákroků lze někdy provést balónkovou dilataci, v jiných indikacích je nutné chirurgické řešení (pyloromyotomie, resekční zákroky, bypassy).