

Hypetrofická pylorostenóza

Hypertrofická pylorostenóza je vrozený defekt trávicí trubice, který se projeví již u novorozence a je jednou z nejčastějších chirurgických indikací v tomto věku. Vyskytuje se asi u cca u 8 dětí z tisíce, je 5x častější u chlapců než u dívek.

Příčiny

Jedná se o vrozenou hypertrofii svaloviny pyloru, která se současným edémem (otokem) sliznice vede k [mechanické obstrukci](#) výtokové části žaludku. Přesná příčina je nejasná, ale může jít o nedostatek enzymu **NO syntázy** v tkáni pyloru.

Pozn: Pylorostenóza se může objevit i u dospělých, zde jde však o důsledek zúžení pylorického kanálu u [žaludečních tumorů](#), [gastroduodenálních vředů](#) a v rámci hojivých procesů s fibrotizací.

Projevy

Začínají do 4 týdnů života, typické je **projektilové zvracení** (zvracení obloukem), které se objeví krátce po jídle. Zvratky neobsahují žlučové šťávy, ale někdy mohou obsahovat krev. Chůze k jídlu přetrvává, nicméně se prohlubuje dehydratace, podvýživa a **rozvrat vnitřního prostředí** (hypochloremická alkalóza), které bez léčby vedou ke smrti dítěte.

Diagnostika

Diagnostika je spíše v rukou dětských lékařů – důležitá je informace o projektilovém zvracení, při fyzikálním vyšetření pohmatem lze někdy nahmatat zvětšený pylorus jako rezistenci velikosti třešně (olivy) v nadbřišku vpravo od podélné středové osy. Ze zobrazovacích metod se nejčastěji provádí nezatažující ultrazvuk břicha.

Terapie

Jedinou účinnou terapeutickou možností je **pyloromotomie** s protětním svaloviny pyloru. Po operaci dochází k rychlému vymizení obtíží.

