

# Vředová choroba

Vředová choroba gastroduodena (tj. žaludku a dvanáctníku) a její komplikace patří mezi nejčastější problematiku současné gastroenterologie. Vředovou chorobou je ohroženo asi 10% populace a komplikace neléčené vředové choroby mohou být i život ohrožující.

Nejprve je nutné osvětlit si pojem žaludečního a dvanáctníkového vředu. **Vřed** je defekt sliznice, který dosahuje do větší hloubky než je lamina muscularis musocae (tj. do podslizničního vaziva a hlouběji). Mělké defekty sliznice se označují jako **eroze**.

Gastroduodenální vředy, jak již bylo řečeno výše, rozdělujeme na **vředy žaludku** a **vředy dvanáctníku**, kromě toho rozlišujeme vředy **akutní** a **chronické**. Nebezpečnou formou je **maligní vřed**, což je ve skutečnosti exulcerovaný zhoubný **tumor žaludku**, který vřed napodobuje (asi 4-5% žaludečních vředů). U dvanáctníkových vředů toto riziko prakticky neexistuje.

Výskyt vředů je zvýšený u některých chorob a charakteristických stavů jako je například cirhóza jaterní, chronické selhávání ledvin, pacienti po transplantacích a u CHOPN.

Podrobnější informace naleznete zde:

[Příčiny vředové choroby](#)

[Projevy vředové choroby](#)

[Komplikace vředové choroby](#)

[Diagnostika vředové choroby](#)

[Léčba vředové choroby](#)