

Kolorektální karcinom

Kolorektální karcinom je jednou z nejčastějších maligních onemocnění v ČR, jeho incidence činí cca 80 na 100,000 osob ročně – muži 95/100,000 za rok ženy 46/100,000 za rok. Ročně je diagnostikováno cca 8,000 pacientů s tímto tumorem a 4,000 nemocných ročně umírá. **Celosvětově umírá na kolorektální karcinom přes 500 tisíc lidí ročně a jedná se o 3. nejčastější tumor po tumorech plic a prsu.**

Nemoc postihuje jedince v produktivním věku a při pozdním záchytu je buď kurativně neléčitelná, nebo je výrazně finančně náročná. Typický věk záchytu je 60-70 let, nicméně asi 20% pacientů je mladších.

Z celkového počtu lze vydělit jednotlivé skupiny dle mechanismu vzniku:

Sporadický kolorektální karcinom – 75% případů

Kolorektální karcinom s familiárním výskytem – 10-30%

Hereditární nepolypózní kolorektální karcinom ([HNPCC](#)) – 1-3%

Kolorektální karcinom asociovaný s [FAP](#) – 0.5%

Kolorektální karcinom asociovaný se vzácnými syndromy – 0.1%

Více informací najdete v jednotlivých článcích

[Příčiny kolorektálního karcinomu](#)

[Kancerogeneze kolorektálního karcinomu](#)

[Hereditární nepolypózní kolorektální karcinom](#)

[Projevy kolorektálního karcinomu](#)

[Diagnostika kolorektálního karcinomu](#)

[Terapie kolorektálního karcinomu](#)

Vzhledem k častému výskytu kolorektálního karcinomu a zároveň diagnostickým možnostem zachytit jej v časně, nebo v přednádorové fázi byl vytvořen [depistážní](#) (screeningový) program určený jedincům s průměrným rizikem a dále existují speciální [dispenzární programy](#) pro jedince s vyšším rizikem. Více si přečtete zde:

[Depistážní program kolorektálního karcinomu](#)

[Dispenzární programy kolorektálního karcinomu](#)